

Министерство здравоохранения РФ  
Кемеровская государственная медицинская академия

**СБОРНИК ТЕСТОВ**  
по хирургическим болезням  
для выпускных экзаменов  
на стоматологическом факультете

Кемерово - 2005

## **Сбоник тестов по хирургическим болезням**

для выпускных экзаменов на стоматологическом факультете.

Под ред. В.И. Подолужного. Кемерово, 2005.-51с.

### **Редактор**

В.И. Подолужный - зав. кафедрой госпитальной хирургии  
ГОУ ВПО КемГМА Минздрава России

### **Составители:**

В.И. Подолужный  
С.В. Иванов  
В.И. Тарабрин  
В.В. Павленко  
Н.А. Нестерович

### **Рецензенты:**

Дамбаев Георгий Цыренович - доктор медицинских наук, профессор, чл.-корр. РАМН, зав. кафедрой госпитальной хирургии с курсом онкологии Сибирского государственного медицинского университета.

Полуэктов Владимир Леонидович - доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой хирургических болезней №1 с курсом урологии Омской государственной медицинской академии

## I вариант

1. Острый аппендицит чаще встречается в возрасте:

- а) до 10 лет;
- б) от 10 до 20 лет;
- в) от 20 до 40 лет;
- г) от 50 до 70 лет;
- д) старше 70 лет.

2. Что не входит в классификацию острого аппендицита по Колесову?

- а) аппендикулярная колика;
- б) катаральный аппендицит;
- в) тотальный аппендицит;
- г) деструктивный (флегмонозный, гангренозный) аппендицит;
- д) осложненный аппендицит.

3. При остром аппендиците у взрослых реже всего наблюдается:

- а) боль в животе;
- б) повышение температуры;
- в) частый жидкий стул;
- г) тошнота;
- д) однократная рвота.

4. Появление болей в подложечной области и их смещение через несколько часов в правую подвздошную называется симптомом:

- а) Ровзинга;
- б) Ситковского.
- в) Воскресенского
- г) Кохера
- д) Щеткина-Блюмберга

5. Симптом «рубашки» - это:

- а) симптом Воскресенского;
- б) симптом Раздольского;
- в) симптом Ровзинга;
- г) симптом Кохера;
- д) симптом Щеткина-Блюмберга.

6. О вовлечении в воспалительный процесс париетальной брюшины более всего свидетельствует:

- а) срок заболевания;
- б) лейкоцитоз;
- в) повышение температуры тела;
- г) появление рвоты;
- д) появление защитного напряжения мышц и симптомов раздражения брюшины.

## II вариант

1. Основная причина острого аппендицита из перечисленного:
  - а) наследственность;
  - б) инфекция;
  - в) запоры;
  - г) поносы;
  - д) обтурация просвета червеобразного отростка.
2. Воспаление при остром аппендиците начинается:
  - а) со слизистой червеобразного отростка;
  - б) с серозного покрова червеобразного отростка;
  - в) с мышечного слоя червеобразного отростка;
  - г) со слепой кишки;
  - д) с подвздошной кишки.
3. Боль в животе при остром аппендиците начинается:
  - а) в правой подвздошной области;
  - б) в околопупочной области;
  - в) в подложечной области;
  - г) по всему животу;
  - д) во всех перечисленных отделах живота.
4. Локализация болей по правому флангу и в правой поясничной области при остром аппендиците характерна для:
  - а) типичного расположения червеобразного отростка;
  - б) тазового расположения;
  - в) подпеченочного расположения;
  - г) ретроцекального расположения;
  - д) формирования парааппендикулярного абсцесса.
5. Для перфоративного аппендицита у взрослых не характерен симптом:
  - а) внезапного усиления болей в животе;
  - б) нарастания клиники перитонита;
  - в) Щеткина-Блюмберга;
  - г) Воскресенского;
  - д) мягкого живота при пальпации.
6. Основным симптом острого аппендицита:
  - а) боль в животе;
  - б) тошнота, рвота;
  - в) локальная болезненность и напряжение мышц в правой подвздошной области;
  - г) повышение температуры тела;
  - д) жидкий стул.

Отпечатано редакционно-издательским отделом  
ГОУ ВПО КемГМА Минздрава России

650029, Кемерово,  
ул. Ворошилова, 22а.  
Тел./факс. +7(3842)734856;  
**epd@kemsma.ru**



Подписано в печать 05.01.2005  
Гарнитура таймс. Тираж 100 экз.  
Формат 21×30½. У.п.л. – 3,0.

Отпечатано с готового оригинал-макета  
Лицензия ЛР №21244 от 22.09.97