

Чешуекрылые Нижнего Приамурья: рубежи смены фаун

В. В. ДУБАТОЛОВ

*Институт систематики и экологии животных СО РАН
630091, Новосибирск, ул. Фрунзе, 11
E-mail: vvdubat@mail.ru*

АННОТАЦИЯ

Проанализировано изменение фауны чешуекрылых (без молей) от Южного Приморья до устья Амура. Наибольшее изменение зарегистрировано в направлении с юга на север на границе многопородных широколиственных лесов. Это место предложено считать северо-восточной границей Приамурско-Маньчжурского (Стенопейского или Палеархеарктического) зоогеографического гориона. Территория севернее этой границы близ устья Амура населена переходной фауной. Основные рубежи смены разных фенологических комплексов (весеннего, летнего и осеннего) различны по положению.

Ключевые слова: фаунистический рубеж, граница, чешуекрылые, Приамурье.

Фауна чешуекрылых на юге российского Дальнего Востока считается хорошо изученной. Тем не менее к началу XXI в. наиболее полно исследованы территории Южного Приморья и частично – южные части Амурской области и Ерейской АО. Этого нельзя сказать о нижней части бассейна Амура. Даже по крупным чешуекрылым (*Macrolepidoptera*) в достаточной мере не изучены ни относительно хорошо доступные окрестности Хабаровска, ни долина р. Амур между Хабаровском и устьем этой реки.

На нижнем Амуре проходит северо-восточная граница Восточно-Азиатской подобласти Палеарктики. Существует еще несколько других названий этого гориона – Палеархеарктическая, Приамурская, Маньчжурская, Стенопейская [1–4]. Для этого гориона в дальнейшем будет использовано название Приамурско-Маньчжурская подобласть. Другие названия предложены для обозначения значительно более обширной территории Восточной Азии, вплоть до Южного Китая и Восточных Гималаев. Ранее показано, что

эта подобласть имеет значительно меньшую площадь и не включает бассейн р. Янцзы [5–8]. Во многих исследованиях XIX–XX вв. эту подобласть называли Маньчжурской, но А. И. Куренцов в середине 60-х гг. предложил считать ее Приамурской [2]. Название Приамурско-Маньчжурская наиболее точно очерчивает территорию этого гориона.

Реальное положение северо-восточной границы Приамурско-Маньчжурского гориона в Приамурье по насекомым до сих пор никто специально не изучал. Эту границу проводили по-разному: Н. Я. Кузнецов опубликовал два варианта этой границы – чуть южнее Хабаровска и рядом с устьем Амура [9]; А. И. Куренцов экстраполировал ее по пределу распространения многопородных широколиственных лесов [2], который, как выяснили ботаники, по правобережью Амура вытянут до Софийска, а по левому берегу – до Киселевки [10, 11]. Позднее А. Ф. Емельянов отнес к выделенному им Стенопейскому горону лишь долину Уссури до Хабаровска, в то время как долину нижнего течения Аму-