

В Ъ Д О М О С Т Ь

объ оспопрививаніи по III медицинскому участку
за 1891 годъ.

	Вакцини- ровано.	Ревакци- нировано.
<i>Толоконской волости.</i>		
Хуторъ Красный - - - - -	44	65
Головино - - - - -	174	254
Гришевка - - - - -	21	—
Болдыревка - - - - -	24	30
Стар. Нелидовка - - - - -	46	35
Хуторъ Троицкій - - - - -	3	—
Варваровка - - - - -	22	2
Наумовка - - - - -	5	93
Журавлевка - - - - -	86	49
Николаевка - - - - -	29	39
Ольховатка - - - - -	21	59
Толоконное - - - - -	12	32
Ганновка - - - - -	10	—
Бехлевка - - - - -	18	—
Салтыково - - - - -	11	3
Воскресеновка - - - - -	47	3
<i>Безсоновской волости.</i>		
Новая Деревня - - - - -	16	15
Долбино - - - - -	18	128
Араповка - - - - -	56	85
Деревня Николаевка - - - - -	16	58
Безсоновка - - - - -	104	187
Хуторъ Араповскій - - - - -	8	40
Щетиновка - - - - -	18	—
Кобелевка - - - - -	66	55
Веселая Лопань - - - - -	42	98
Хуторъ Угримъ - - - - -	4	84
„ Алмазный - - - - -	4	—

A

Отчетъ по 4 медицинскому участку Бѣлгородскаго уѣзда за 1893 годъ.

Общее число больныхъ въ истекшемъ году было у врача 2509 чел., сдѣлавшихъ 4278 посѣщеній; у фельдшеровъ—4369 чел., посѣщеній—6699. Отношеніе между числомъ больныхъ и числомъ посѣщеній выражается у врача какъ 1:1,7, у фельдшеровъ какъ 1:1,5. При распредѣленіи больныхъ по поламъ, первое мѣсто занимаютъ дѣти (2455), второе—женщины (2357) и, наконецъ, мужчины (2066).

Въ общемъ числѣ больныхъ 1-й группы—1148 чел. — большую половину составляютъ дѣти (655), меньшая половина приходится на женщинъ и мужчинъ, почти поровну: 247 и 246. Общая смертность этой группы 54,8⁰/. Распредѣляя эту сумму по болѣзнямъ, получимъ слѣдующій порядокъ: сифились—400, оспа—255 (°/о смертности 11,3), брюшной тифъ—116 (°/о смертности 17,2), гриппъ—101 (°/о смертности 1,9), коклюшь—91 (°/о смертности 1,1), неопредѣленный тифъ—49, корь—41, кровавый поносъ—98 (°/о смертности 5,2), заушница—13 и, наконецъ, дифтеритъ и крупозное воспаленіе легкихъ по 10 (°/о смертности 30 и 20,0.) Остальные болѣзни этой группы встрѣчались единичными случаями и эпидемическаго характера не имѣли.

Сифились наблюдался въ 28 селахъ участка, при чемъ вторичная форма значительно преобладала; отношеніе третичнаго сифилиса ко вторичному выразится, какъ 1:2,7. Процентное отношеніе сифилитиковъ къ общему числу жителей тѣхъ селъ, въ коихъ они наблюдались, будетъ для II формы 11,3 р. т., для III формы 4,1 р. т.

Оспа наблюдалась въ 24 селеніяхъ, при чемъ наиболѣе пострадавшими можно считать села: Муромъ, Старицу, Нечаевку и Маслову Пристань. Болѣли по преимуществу невакцинированныя дѣти и между ними же и замѣчалась наибольшая смертность. Въ настоящій моментъ эпидемію оспы можно считать вполне законченной, продолжительность же ея—болѣе года—указываетъ на весьма благоприятную для нея почву въ смыслѣ большого числа не привитыхъ, въ силу необязательности у насъ оспопрививанія.

Брюшной тифъ въ формѣ сельской эпидеміи наблюдался въ Логовомъ: начавшись въ іюлѣ, онъ достигаетъ своего аспе въ сентябрѣ, значительно ослабѣваетъ въ октябрѣ и прекращается въ ноябрѣ. Изъ прочихъ 12 селъ, пожалуй, можно отмѣтить Безлюдовку и Крутой Логъ, въ которыхъ общая годовая сумма больныхъ указываетъ какъ бы на

гнѣздное развитіе болѣзни, но по продолжительности времени, въ которое слагалась эта сумма, вѣриѣе будетъ отдѣльныя заболѣванія отнести къ единичнымъ случаямъ. То же можно сказать и объ остальныхъ селахъ.

Гриппъ наблюдался въ 18 селахъ участка и навѣрно въ гораздо большемъ числѣ случаевъ, чѣмъ удалось зарегистрировать, ибо весьма часто приходилось у больныхъ, жалующихся на кашель, находить начало его въ протекшемъ уже заболѣваніи гриппомъ. Кратковременное теченіе болѣзни и предварительные сборы ко врачу изъ отдаленныхъ мѣстностей—вотъ причины наблюденій послѣдствій гриппа, а не самой болѣзни; отсюда не полная регистрація.

Коклюшъ въ формѣ сельскихъ эпидемій наблюдался: въ апрѣлѣ—въ Графовкѣ, въ августѣ въ Нечаевкѣ и въ декабрѣ—въ Архангельскомъ; въ остальныхъ 3 селахъ встрѣчался единичными случаями.

Неопредѣленный тифъ отмѣченъ въ 11 селахъ, при чемъ наибольшая сумма отдѣльныхъ наблюденій падаетъ на то же село (Логовое—18), гдѣ имѣлась эпидемія брюшнаго тифа. Среди ясной картины послѣдняго, особенно въ началѣ (авг. мѣс.), когда больные продолжали работать наравнѣ съ здоровыми и, послѣ 4—5 дней лежанія, преждевременно принимались за работу снова, наблюдались случаи крайне не ясные, но, несомнѣнно, тифознаго характера, которые и были отнесены къ группѣ неопредѣленной формы тифа. Въ прочихъ же селахъ онъ наблюдался единичными случаями, по одному, по два въ мѣс.

Корь изъ 4 селъ въ формѣ сельской эпидеміи наблюдалась въ с. Нескучномъ.

Кровавый поносъ отмѣченъ въ 7 селахъ. Число больныхъ (37) по отношенію къ суммѣ жителей этихъ селъ (11703) исключаетъ эпидемическій характеръ болѣзни. Умерло двое—старикъ 60 л. и ребен.

Остальныя болѣзни 1 группы, разбросанныя по мѣсяцамъ и селамъ, встрѣчались въ ограниченномъ числѣ случаевъ—спорадически.

Изъ II группы малярія даетъ внушительную сумму 1157 челов., которая по отношенію суммы всѣхъ больныхъ составляетъ 16,8%, болѣе, сравнительно съ прошлымъ годомъ, на 5,1%.

Переходя, затѣмъ, къ остальнымъ группамъ, приходится, по суммѣ отдѣльныхъ наблюденій, остановиться на болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ (804 чел.), пищеварительныхъ (677), болѣзни кожи (562) и конституціональныхъ (433). Эти 4 основныхъ группы болѣзней по своей этиологіи даютъ полную характеристику заболѣваемости крестьянъ. И дѣйствительно—простуда, однообразная и весьма обременительная для

желудка пища, накопецъ, крайняя нечистоплотность — вотъ тѣ агенты, на почвѣ которыхъ развиваются болѣзни гриппы XVI, а между ними видное мѣсто занимаетъ золотуха и анемія, по преимуществу, у женщ.

Въ отчетномъ году общее число дѣтей, коимъ надлежало привить оспу, выражается цифрою 1579, всѣхъ же привитыхъ, какъ видно изъ прилагаемой вѣдомости, 1653 чел. Казалось бы, остатка не должно быть, на самомъ же дѣлѣ онъ выражается довольно почтенною цифрою 1203. Дѣло въ томъ, что въ истекшемъ году мы, въ сущности прививали оспу дѣтямъ, рожденнымъ въ 1890 году (это, впрочемъ, относится не ко всѣмъ селамъ), и коихъ къ концу сказаннаго года считалось 1210 чел., а изъ дѣтей отчетнаго года привито только 443, остальные же 1136 чел. будутъ прививаться въ 1892 году. Если, впрочемъ, изъ этого числа исключить дѣтей, болѣвшихъ оспою (240), которыя въ силу перенесенной болѣзни получали невосприимчивость къ новому заболѣванію, то получимъ дѣйствительный остатокъ на будущій годъ — 968. Кромѣ дѣтей, ревакцинировано 259 взрослыхъ. Количество израсходованнаго детрита — около 100 трубочекъ результатъ успѣшный, судя по контролю дѣтей на выдержку по нѣсколько десятковъ чел. изъ каждаго села.

Въ санитарномъ отношеніи учасокъ находится въ одномъ и томъ же положеніи, о которомъ не разъ приходилось говорить въ отчетахъ прошлыхъ лѣтъ. Навозъ и различные отбросы пищевыхъ веществъ составляютъ принадлежность каждаго двора. Періодическое удаленіе всѣхъ нечистотъ производится ежегодно весною, хотя и довольно поздно, и то въ тѣхъ селахъ, вблизи которыхъ расположены экономическія поля. Тамъ же, гдѣ таковыхъ нѣтъ, никто изъ крестьянъ не думаетъ утилизировать нечистоты путемъ удаленія на свои собственные поля: до пониманія уплаты со стороны земли за удобреніе лучшимъ урожаемъ они еще не дошли, имъ нужны вещественные знаки, часть которыхъ уйдетъ на благосостояніе держателей питейныхъ домовъ.

При посѣщеніи школъ какихъ-либо заразныхъ болѣзней среди учениковъ наблюдаемо не было, исключая, впрочемъ, сифилиса и то не во всѣхъ школахъ. Больные немедленно удалялись, лѣчились и вновь принимались въ школу съ разрѣшенія врача.

Дѣятельность акушерки-фельдшерицы, кромѣ ближайшей помощи врачу во время пріема больныхъ и завѣдыванія аптекою, выражается числомъ 11 нормальныхъ родовъ.