

636.4
A15

A

Н. К. З.


ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ

Выпуск № 45.

Т. П. АБОЛЬ.

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ И АНГЛИЙСКИХ ПОРОСЯТ

(из работ отдела животноводства).



Издание Зап. Обл. с.-х. опытной станции

1930

A

1 9 АВГ 1966
Включено
в каталог

ПРОВЕРЕНО
1954 г.

12 ФЕВ 1983

Вязьма.
Тип. Комтреста.
Заказ № 1198
Тираж 2.000 экз.
Окрит № 255.

Фонд. Фона

636.4
А 15

И. Вилитенко

Развитие английских и местных поросят в условиях ЗОСХОС.

Вопрос о том, какая порода свиней должна разводиться в нашем Союзе, как-будто разрешен окончательно в пользу крупной английской белой свиньи, отличающейся скороспелостью, хорошей оплатой корма, хорошим экстерьером и высоким качеством мясных продуктов. В общем, английская свинья полностью удовлетворяет требованиям мясного животного.

Вместе с тем, наряду с английской на западе СССР распространена другая свинья, местной породы, так называемая короткоухая, отличающаяся от нее по экстерьеру, масти, позднеспелости и худшим качеством продукта. Местная свинья в обыкновенных крестьянских условиях (холодный хлев и скудное кормление) достигает в среднем к годовому возрасту 80 кг. живого веса.

Такая задержка в развитии заставляет сельского хозяина искать иных путей к получению более скороспелого животного и, как следствие, стремление его приобрести свинью крупной английской белой породы. Английская свинья, находясь в условиях крестьянского содержания и кормления, не дает того эффекта в росте, как при нормальных условиях, достигая к году значительно ниже своего среднего веса. Одним из главных тормозов в нормальном развитии англий-

П. 12.778

ской белой свиньи в крестьянском хозяйстве является ее ненормальное содержание и кормление.

Теперь возникает вопрос, почему местная свинья отличается позднеспелостью и низкой оплатой корма, благодаря ли природным своим качествам, или несовершенству условий, в которых она находится.

Отдел животноводства ЗОСХОС решил изучить местную свинью с определенной целью, как она отзовется на улучшенное содержание и кормление, т. к. поведение крупной английской свиньи в условиях обычного крестьянского кормления и содержания в отношении продуктивности приближается к простой местной. Логически напрашивается вопрос, как будет реагировать местная свинья, если ее несколько поколений поставить в условия нормального содержания и кормления. В случае положительных результатов могла бы быть разрешена серьезнейшая проблема массового улучшения свиноводства в громадном массиве хозяйств Западной части СССР. Дорого стоящий способ улучшения продуктивного свиноводства путем метизации английской свиньей мог бы быть заменен способом массового улучшения местной свиньи в самой себе.

До настоящего времени местная свинья распространена еще в большом количестве в Западной области, в особенности в местностях, лежащих далеко от культурных центров и железных дорог, поэтому Отдел Животноводства ЗОСХОС со дня организации приобрел данных свиней для их изучения, поставив в нормальные условия содержания и кормления.

Первоначальный племенной материал местных свиней, с которым приходится работать на ЗОСХОС, был куплен в 1922 году в Волочковской волости, Дорогобужского уезда, Смоленской губ.

у крестьян поросятами в 6-ти недельном возрасте. При их выборе руководствовались, главным образом, опросами хозяев, внешностью поросят и его родителей, т. к. более подробных сведений о родословной не нашлось.

Из купленных поросят были оставлены на племя один боровок и три свинки.

Экстерьерные особенности местной свиньи, примерно, такие: легкая голова с прямым профилем средней длины, короткие прямо стоячие уши, спина карпообразная, резко опускающаяся к высоко поставленному задку, бока сдавлены, ноги тонкие, крепкие, постановка ног правильная. Свинья вообще отличается крепостью и подвижностью. *)

Характерной особенностью местных боровов является их довольно грубая, тяжелая голова, медвежья вихляющаяся походка, толстая грубая кожа, часто собирающаяся в большие складки на шее, пояснице и около хвоста. Масть местных свиней разная: черная, бурая, рыжая с черными пятнами и без них, желто рыжая с пятнами и без пятен и т. п., а у оставленных на племя в ЗОСХОС 3 свинок и боровка, а также их родителей, следующая:

СВИНКИ:

Воеводиха черная, конец каждой шерстинки окрашен в серый цвет.

Мать—чернопестрая.
Отец—красно-буро-рыжий.

Растеряха вся черная.

Мать—краснобурная.
Отец—красно-буро-рыжий.

*) Описание экстерьера местн. св. из 1 вып. „Вопросы Жив. Зап. обл.“ Витовского стр. 38.