

II.**Керченский известнякъ и его фауна.****Н. Андрусова.**

(Съ 5-ю таблицами.)

Предлагаемая вниманию читателя работа, какъ я надѣюсь, положить начало задуманному мною ряду большихъ и меньшихъ монографій, имѣющихъ своимъ предметомъ фауну русскихъ третичныхъ отложений. Я начинаю съ фауны керченского известняка, потому, что мною обработка ея была закончена прежде всего. Я считалъ необходимымъ не ограничиваться однимъ сухимъ описаниемъ органическихъ остатковъ, и поэтому присоединилъ къ собственно палеонтологической части главы о стратиграфическомъ характерѣ керченского известняка, о подраздѣленіи его и о тѣхъ выводахъ о его характерѣ и возрастѣ, на которые намъ даетъ право изученіе его фауны. Тѣмъ самымъ я думалъ подробнѣе и прочнѣе установить тѣ воззрѣнія на керченский известнякъ, которыя неоднократно высказывались мною въ различныхъ статьяхъ и которыя, собственно говоря, составляютъ лишь дальнѣйшее развитіе высказанной впервые И. Ф. Синцовыми идеи о существованіи между сарматскимъ и pontическимъ ярусами особенного переходнаго. Обработка матеріяла для предлагаемой работы, собранного мною на керченскомъ полуостровѣ въ 1882—1884 году, начата была мною еще въ 1883 г. въ Одессѣ, въ геологическомъ кабинетѣ университета, продолжалась тамже въ 1884;

слѣдующія два года я провелъ за границею, пользуясь для сравненія материаломъ различныхъ музеевъ. Закончилась она наконецъ зимою 1886—87 года въ С.-Петербургѣ. Окончаніе ея постоянно задерживалось какъ другими работами, такъ и тѣми затрудненіями, съ которыми приходилось бороться при обработкѣ нѣкоторыхъ брюхоногихъ, и въ особенности гидробида.

Считаю здѣсь своимъ долгомъ выразить свою живѣйшую признательность всѣмъ тѣмъ лицамъ, которые такъ или иначе помогали мнѣ въ моей работе, а въ особенности проф. И. Ф. Синцову, проф. А. А. Иностранцеву, завѣдующему палеонтологическимъ отдѣленіемъ Вѣнскаго придворнаго музея Т. Фуксу, проф. С. Брузинѣ въ Загребѣ и проф. К. Циттелю въ Мюнхенѣ.

I. Историческія свѣдѣнія.

Какъ мы увидимъ дальше, наиболѣе развитымъ въ ряду пластовъ керченскаго известняка и чаще всего (естественно и искусственно) обнаженнымъ является бѣловатый или желтоватый, мягкий въ свѣжемъ состояніи и твердѣющій на воздухѣ известнякъ. Благодаря мягкости, съ которой онъ поддается обработкѣ топоромъ и пилою, онъ представляетъ превосходный строительный материалъ и известенъ на югѣ Россіи подъ именемъ «керченскаго камня». Отдельныя «штуки» этого камня, выпиленныя въ видѣ продолговатыхъ квадратныхъ призмъ, напоминаютъ по своимъ свойствамъ и внешнему виду штуки одесского и другихъ понтическихъ известняковъ. Это-то внѣшнее сходство и составляло, по видимому, долгое время причину того, что керченскій известнякъ постоянно смѣшивался съ такъ называемымъ «степнымъ» конгревымъ известнякомъ. Такъ Вернейль зоветъ керченскій известнякъ «terrain des steppes» и полагаетъ, что онъ одновремененъ степному известняку Крымской стени, Одессы и Бессарабіи. Въ тоже время онъ думаетъ, что и камышбурунскіе пласти, въ дѣйствительности болѣе молодые, чѣмъ

керченскій известнякъ, одновременны послѣднему. Изъ окаменѣлостей онъ приводить весьма мало. Къ керченскому известняку можно отнести лишь упоминаніе нахожденія въ громадномъ количествѣ гидробидъ (une prodigieuse quantit  de petits Paludines), тогда какъ упоминаемые имъ дальше на той же страницѣ «*Cardium* и *Mystilus polymorphus* (*Dreissena* Van Ben., *Congeria* Partsch)» происходятъ безъ сомнѣнія изъ камышбурунскихъ пластовъ. Отсюда же взяты всѣ описанныя Дегэ въ приложениі къ статьѣ Вернейля формы. Что касается батрологического положенія керченского известняка, то онъ его ошибочнымъ образомъ ставить ниже мшанковаго известняка. Эту ошибку повторяли за нимъ и многіе другіе авторы. Подъ «*terrain des steppes*» слѣдуетъ по Вернейлю уже осадки морскаго характера, самая же *terrain des steppes* отложеніе соленоватоводное.

У Гюо мы находимъ керченскій известнякъ попавшимъ въ различные горизонты. Онъ дѣлить крымскіе третичные пласти на три отдѣла, причемъ нижній (A), или нуммулитовый известнякъ на Керченскомъ полуостровѣ не встрѣчается, тогда какъ средній (B) состоитъ здѣсь преимущественно изъ мергелей и глинъ и распадается на три части (assises). Нижняя (a) сложена изъ (1) argile rouge ou brune, (2) argile grise и (3) couches calcaires et gypseuses.

Средняя (b) состоитъ изъ «nombreuse serie de couches calcaires et marneuses». Assisses (a) и (b) у Гюо соответствуютъ приблизительно ярусамъ *a* и *b* у Абиха.

Верхняя часть (c) представляетъ по Гюо три одновременныхъ образованія ¹⁾). Одно изъ нихъ является, по описанію автора, у «батареи Св. Павла», т. е. на Павловскомъ мысу надъ мергелистыми и известковыми пластами (b) въ видѣ голубоватаго глинистаго мер-

¹⁾ „Elle nous a paru se composer de trois depôts differents, mais paralleles reposant tous trois sur l'assisse precedente et recouvertes également par l'etage supérieur.