

ватого цвѣта съ Ч. запахомъ. Оно имѣть удѣлъ 1,046—1,057 и не вращаетъ плоскости поляризаціи. Вертгеймъ, изслѣдовавшій масло въ 1844 г., нашелъ, что его главную составную часть составляютъ сѣрнистый аллилъ, и его работа безъ дальнѣйшей проверки принималась всѣми до послѣдняго времени. Землеръ въ 1892 г. показалъ подробными и обстоятельными изслѣдованіями, что въ Ч. маслѣ нѣтъ и слѣдовъ сѣрнистаго аллила. При перегонкѣ подъ уменьшеннымъ давленіемъ Землеръ выдѣлилъ слѣдующія сѣрнистыя соединения: 1)  $C_2H_5.S.S.C_2H_5$  (60%) съ темп. кип.  $66^\circ - 69^\circ$  при 16 мм.; 2)  $C_3H_5.S.S.C_2H_5$  (60%) съ темп. кипѣнія  $79 - 81^\circ$  при 16 мм. и 3)  $C_4H_9.S.S.C_2H_5$  (20%) съ темп. кип.  $112^\circ - 122^\circ$  при 16 мм. Въ остаткѣ отъ перегонки имѣется, повидимому, соединеніе состава  $C_6H_{10}S_4$ . Кромѣ перечисленныхъ сѣрнистыхъ соединеній, Ч. масло содержитъ сексвитерпенъ состава  $C_{15}H_{24}$  съ т. к.  $254^\circ$ . К. Дебу. Δ.

**Чесотка** (Scabies) — представляетъ наклонное заблѣваніе, вызываемое животнымъ паразитомъ — чесоточнымъ клещемъ. О свойствахъ послѣдняго — см. соответственную статью. Была ли извѣстна Ч. въ древности, трудно рѣшить. Специальное описаніе Ч. мы находимъ лишь у арабскихъ врачей, и Авензоаръ упоминаетъ даже о присутствіи при ней животнаго паразита. Но первое указаніе на счетъ чесоточнаго клеща находится въ сочиненіи «Physica» святой Гильдегарды, настоятельница монастыря на Рупертсбергѣ, относящемуся къ срединѣ XII столѣтія. Въ XVII в. Бономо далъ образцовое описаніе клеща и его отношенія къ Ч. Имѣются сообщенія, что въ это время старыя женщины во многихъ мѣстахъ излѣчивали Ч. вылавливаніемъ клещей. Тѣмъ не менѣе многіе врачи считали Ч. конституціональнымъ заблѣваніемъ, развивающимся вслѣдствіе порчи крови, и даже въ началѣ XIX в. еще не особенно вѣрили въ паразитарное происхожденіе ея. Такъ, напр., въ Парижѣ въ 1812 г. была назначена премія за открытіе чесоточнаго клеща. Премію эту получилъ Галѣ (Galès); но впоследствии выяснилось, что онъ демонстраторъ сырнаго клеща. Только въ 1834 г. Ренуцци, парижскій студентъ изъ Корсики, научилъ парижскихъ врачей отыскивать чесоточнаго клеща. Съ тѣхъ поръ свѣдѣнія о немъ больше не затеривались. Изученіемъ Ч. во всѣхъ ея подробностяхъ мы обязаны главнымъ образомъ работамъ Гебры (1844). Ч. возникаетъ только путемъ перенесенія оплодотворенной самки чесоточнаго клеща или нѣсколькихъ клещей разнаго пола съ больного человѣка или животнаго; изъ животныхъ чесоточный клещъ водится у собакъ, кошекъ, лошадей, кроликовъ, верблюдовъ и др., вызывая у нихъ болѣзнь, извѣстную подъ именемъ коросты. Зараженіе Ч. можно воспроизвести экспериментальнымъ путемъ. Если оплодотворенную самку положить на какое-либо мѣсто кожи, то она начинаетъ довольно быстро двигаться (по Вормсу, со скоростью 2 см. въ минуту), то останавливается, то возвращаясь назадъ, какъ бы ища мѣста, гдѣ легче вѣдриться. Наконецъ останавливается

и, упершись при помощи длинныхъ щетинокъ задней частью тѣла и приподнявъ ее вверхъ, она наклоняетъ свой головной конецъ внизъ и проникаетъ въ косомъ направленіи черезъ эпидермисъ въ болѣе глубокие слои кожи (до такъ назыв. сосочковаго тѣла), затѣмъ проходитъ дальше параллельно поверхности, и такимъ способомъ образуется клещевой ходъ. Клещевые ходы представляютъ самый характерный симптомъ Ч.; они имѣютъ видъ сѣрыхъ, а у людей нечистоплотныхъ почти черныхъ, мелкопунктированныхъ линій, длиною въ среднемъ около 1 см.; эти линіи рѣдко бываютъ прямыя, обыкновенно же — кривыя или волнообразно изогнутыя. На мѣстѣ, гдѣ клещъ вѣдряется въ кожу (такъ назыв. головной конецъ хода), образуется обыкновенно маленький пузырекъ или гнойничекъ, который черезъ короткое время подсыхаетъ; по отпаденіи корочки остается нѣсколько воронкообразное отслоеніе эпидермиса. На противоположномъ (такъ назыв. хвостовомъ) концѣ хода можно при тонкой, нѣжной кожѣ видѣть просвѣчивающаго въ видѣ блѣвотой точки клеща, откуда его легко и выловить иглой. Въ клещевомъ ходѣ находятся еще до 20 и болѣе овальныхъ яицъ, расположенныхъ обыкновенно перпендикулярно къ оси хода. Чесоточный клещъ имѣетъ свои излюбленныя мѣста, гдѣ онъ по преимуществу вѣдряется, такъ что уже по одной локализациі можно иногда распознать Ч. Эти мѣста суть: боковыя поверхности ручныхъ пальцевъ и межпальцевыя складки, сгибательная сторона запястья, окружность локтевого сустава, передняя подмышковая складка, область пупка, половой членъ и мошонка, кожный стибъ, внутренній край стопы, у женщинъ грудной сосокъ и его окружность; у людей, работающихъ въ сидячемъ положеніи, кожа надъ сѣдалищными буграми, а у дѣтей и у лицъ съ нѣжной кожей вся ладонь и подошва; лицо и голова почти всегда остаются свободными. Субъективно начало болѣзни обозначается появленіемъ сильнаго зуда, который вызывается сперва вѣдреніемъ и движеніями клеща, а затѣмъ раздраженіемъ окончаній чувствительныхъ нервовъ его челюстями. Зудъ можетъ достигать такой степени, что больной совершенно лишается сна; тѣмъ болѣе, что въ теплой постели зудъ усиливается. Вслѣдствіе расчесовъ появляются вторичныя измѣненія на кожѣ въ видѣ красноватыхъ возвышеній (папулы), пузырьковъ, гнойничковъ — вторичная экзема. Послѣдняя держится въ общемъ также излюбленныхъ мѣстъ расположенія клещевыхъ ходовъ, но при запущенной Ч. иногда распространяется по всему тѣлу. У женщинъ развивающаяся экзема грудного соска можетъ повести къ воспаленію грудной железы (маститъ). Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ, у людей съ вялой, нечувствительной кожей, которые поэтому мало чешутся, происходитъ накопленіе массы корокъ на кожѣ, которое можетъ достигать высоты въ нѣсколько сантиметровъ. Въ этихъ коркахъ гнѣздится огромное количество клещей, какъ самокъ, такъ и самцовъ. Это — такъ назыв. норвеж-



ская Ч., описанная впервые Бекком у прокаженных въ Норвегіи. Воспримчивость къ Ч. одинакова присуща всѣмъ людямъ. Но зараженіе происходитъ только при тѣсномъ прикосновеніи, какъ, напр., при снахѣ въ одной кровати, при половых сношеніяхъ; одно рукопожатіе чесоточнаго еще не заражаетъ. Эти условія объясняютъ большее распространеніе Ч. въ низшихъ слояхъ населенія, гдѣ живутъ въ тѣсныхъ помѣщеніяхъ, спать въ повалку. Но и въ высшихъ классахъ Ч. не такъ рѣдка. Точно также Ч. быстрое передается между дѣтьми, въ виду ихъ болѣе интимныхъ физическихъ отношеній. Болѣзнъ, правильно распознанная, излѣчивается вполнѣ въ короткое время; если же она не распознана, то можетъ, вопреки лѣченію, длиться годами, истощая больного вслѣдствіе безсонницы, зуда и т. д. Для лѣченія применяются средства, убивающія чесоточнаго клеща, какъ сѣра, нафтоль, перуанскій бальзамъ и др. При неправильно проведенномъ лѣченіи, если хоть одинъ экземпляръ клеща остался не убитымъ, наступаетъ рецидивъ. Для полного успѣха лѣченія необходимо осмотрѣть всѣхъ членовъ семьи и подозрительныхъ въ смыслѣ Ч. подвергать соответственному лѣченію, иначе они все будутъ продолжать заражать другъ друга. Въ рѣдкихъ случаяхъ остаются еще послѣ излѣченія Ч. на нѣкоторое время чирья, экзема, въ особенности вокругъ соска у женщинъ и около пупка, затѣмъ зудъ. Послѣдній иногда заставляетъ больного думать о рецидивѣ, и такимъ образомъ развивается боязнь Ч. (скабиофобія); больной переходитъ отъ врача къ врачу, подвергается повторно противочесоточному лѣченію, его кожа раздражается все болѣе и болѣе, пока наконецъ нѣсколько теплыхъ ваннъ и простая пудра не положатъ конецъ его физическому и психическому страданію.

В. М. О-й.

**Чесотка домашнихъ животныхъ.**—Ч. является одной изъ распространенныхъ болѣзней среди нашихъ домашнихъ млекопитающихъ, особенно въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Ч.—болѣзнъ кожи, обусловленная присутствіемъ особаго клеща. имѣющаго нѣсколько подраздѣленій и соответствующее этому вызывающаго различныя формы заболѣваній. У животныхъ наблюдаются три рода чесоточныхъ клещей: 1) зудни (sarcoptes), 2) накомники (dermatocoptes) и 3) кожебды (dermatophagus). Зудные клещи прорываютъ себѣ ходы въ кожицѣ и питаются плазмасодержащими клѣтками Мальпигиевой сѣти; они размножаются въ этихъ ходахъ, чѣмъ и вызываютъ сильное воспаленіе кожи; различаютъ два вида зудней: большой и малый; къ первому принадлежатъ sarcoptes scabiei (водится у человека, лошади, овцы, лѣва, кролика) и S. squamiferus (у собаки, свиньи, овцы, козы); малый зудень (sarcoptes pinor) бываетъ у кошки и у кролика. *Накомники* живутъ на поверхности кожи и посредствомъ своихъ ротовыхъ органовъ сосутъ кровь, сыроворотку и лимфу изъ кожи, при этомъ они прикрѣпляются къ чешуйкамъ и волосамъ; бываетъ этотъ клещъ у лошади, рог. скота и

овцы. *Кожебды* живутъ на поверхности кожи, главнымъ образомъ на конечностяхъ, и питаются молодыми чешуйками кожицы, которую они грызутъ; различаютъ: 1) кожебда лошади и быка, который вызываетъ Ч. ногъ и зада, 2) кожебда овцы—Ч. ногъ у овцы. При разсмотрѣніи Ч. по отдѣльнымъ видамъ домашнихъ животныхъ, необходимо прежде всего остановиться на Ч. овцы, такъ какъ этой отрасли скотоводства Ч. наноситъ громадный ущербъ и борьба съ послѣдней до сихъ поръ составляетъ одну изъ существенныхъ заботъ овцеводовъ и промышленности шерстки. Нижеприводимыя цифры наглядно свидѣтельствуютъ о громадномъ ущербѣ, наносимомъ овцеводству Ч.: въ 1884 г. въ Германіи было поражено Ч. до 250000 овецъ, изъ которыхъ на Эльзасъ и Лотарингію приходилось 80000, т. е. 61% всего наличнаго состава овецъ въ этихъ областяхъ; съ 1885 по 1888 гг. въ Пруссіи было больныхъ 183000, въ Баваріи—100000 овецъ; ежегодная потеря шерсти отъ Ч. опредѣляется въ Германіи въ нѣсколько миллионъ марокъ. Въ Россіи Ч. также наноситъ громадный вредъ овцеводству, главнымъ образомъ тонкорунному, и тѣмъ самымъ вопросъ о борьбѣ выдвигается на первый планъ въ овцеводныхъ хозяйствахъ. По среднимъ даннымъ регистрируется въ имперіи ежегодно около 16000 овецъ, 10000 крупнаго рогат. скота и около 3000 лошадей, больныхъ Ч. Но эти статистическія данныя нужно считать далекими отъ дѣйствительныхъ размѣровъ, такъ какъ владѣльцы обращаютъ вниманіе на Ч. только въ случаяхъ ея повальнаго распространенія, отдѣльныя же вспышки проходятъ незамѣтно для регистраціи. Легче всего зараженіе происходитъ отъ впуска стриженныхъ овецъ, больныхъ Ч., въ отару неостриженныхъ, причемъ наибольшее распространеніе и въ болѣе интенсивной формѣ происходитъ въ теплыхъ помѣщеніяхъ при тѣсномъ скучиваніи овецъ, такъ какъ въ теплѣ чесоточный клещъ проявляетъ особенную живость и легко переходитъ отъ овцы къ овцѣ. Любимыми мѣстами паразита являются область крестца и корень хвоста, а затѣмъ онъ переходитъ на спину, бока, шею, плечи. Въ началѣ пораженія появляются небольшіе, въ просное зерно, блѣдно-желтаго цвѣта узелки, вокругъ которыхъ замѣчается краснота кожи, при чемъ послѣдняя дѣлается чувствительной къ малѣйшимъ надавливаніямъ; постепенно узелки превращаются въ пузырьки, которые лопаются или засыхаютъ, кожа начинающая шелушиться, образуется твердая желтобурая чесоточная корка, подъ которую сидятъ чесоточные клещи; черезъ нѣкоторое время пораженіе охватываетъ значительную область тѣла, руно становится косматымъ и сваливается въ комки, а потомъ выпадаетъ пучками; кожа подъ корками теряетъ свой блескъ и гладкость, дѣлается шероховатой и сухой, покрывается морщинами, утолщается въ видѣ мозоли и усеяна корками и трещинами; животное, ощущая сильный зудъ, постоянно растягиваетъ пораженные мѣста, вслѣдствіе чего появляются язвы. Зудъ для боль-



ных животных доставляет страшные мучения: овцы раскусывают, вырывают сами шерсть на пораженных мѣстах, валяются, изгибают спину, скрежещут зубами, судорожно подергивают хвостомъ. Является общее истощеніе организма, худосочіе и ослабѣвшія животныя погибаютъ. Зимой болѣзнь ухудшается, а стрижка и купанье задерживаютъ развитіе Ч.; чаще поражаются культурныя породы овецъ. Распознается болѣзнь, помимо указанныхъ признаковъ пораженія кожи, еще микроскопическими доказательствами присутствія клещей. Ч. требуетъ упорнаго и долгаго лѣченія; для этого предвѣрительно снимаютъ шерсть; пораженные мѣста смазываютъ или обмываютъ веществами, убивающими клещей (карболовое мыло, креолиновая мазь, сѣрая ртутная мазь, табачный щелокъ, нефть), но такое лѣченіе далеко недостаточно—нужно болѣе радикальное при помощи такъ назыв. противочесоточныхъ ваннъ, которыхъ очень много, и всѣ онѣ различаются составомъ своихъ растворовъ. Наиболѣе распространены въ настоящее время *креолиновыя* ванны, введенныя въ Пруссію особымъ приказомъ королевства. До купанья пораженныхъ мѣста смазываются линиментомъ слѣдующаго состава: 1 ч. англійскаго креолина, 1 ч. спирта и 8 ч. зеленого мыла, а потомъ больныя овцы купаются два раза въ водномъ растворѣ англійскаго креолина, съ промежуткомъ между первой и второй ванной въ 7 дней; растворъ креолина  $2\frac{1}{2}\%$ , для ста овецъ требуется  $6\frac{1}{2}$  литровъ креолина на 250 литровъ воды. Креолиновая ванна имѣетъ большія преимущества предъ карболовой и табачной ваннами, главнымъ образомъ своей неядовитостію и дешевизной; затѣмъ шерсть не окрашивается отъ креолина, какъ это бываетъ при табакѣ и мышьякѣ. Изъ 440000 овецъ, лѣчившихся креолиновой ванной, выздоровѣло 76%. Купать овецъ необходимо въ теплую и безвѣтренную погоду. У лошадей различаютъ: 1) зудневую, 2) наожниковую и 3) кожеѣдную Ч. Зудневая форма Ч. начинается на головѣ, шеѣ, плечахъ, боковыхъ стѣнкахъ груди; главный симптомъ—сильный зудъ, который особенно интенсивно проявляется ночью въ теплой конюшнѣ и доводитъ больное животное до бѣшенства. Измѣненія на кожѣ состоятъ въ появленіи маленькихъ узелковъ, на которыхъ шерсть выпадаетъ или же удерживается при посредствѣ клейкой жидкости, выдѣляемой пузырьками; кожа утолщается, дѣлается складчатой, покрывается трещинами и мокнувшими, гнойными разрывами. Наожниковая Ч. поражаетъ большую часть основаніе гривы, хвоста, подчелюстное пространство, вымя и проявляется сначала въ видѣ рѣзко ограниченныхъ, довольно большихъ пятенъ—корокъ. Кожеѣдная Ч. наблюдается преимущественно на концахъ конечностей: въ путовомъ сгибѣ, на плюснѣ, пясти и до колѣна. Наиболѣе излѣчимы наожниковая и кожеѣдная, зудневая же довольно туго поддается лѣченію. Лѣченіе всѣхъ этихъ формъ Ч. состоитъ въ втираніи различныхъ линиментовъ, въ составъ которыхъ входятъ такіа вещества,

какъ креолинъ, вѣнскій деготь; въ упорныхъ случаяхъ употребляютъ сузему ( $1-5\%$ ), отвары табаку ( $5\%$ ), но послѣ обмыванія ими требуется энергичное втираніе вышесказанныхъ линиментовъ. Ч. собакъ—явленіе довольно частое и вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ большую опасность для человѣка, изъ за обычной держать собакъ въ комнатѣ; тѣмъ болѣе опасно позволять собакамъ лежать на постеляхъ, диванѣ. Болѣзнь начинается болѣею частью на головѣ, откуда переходитъ на грудь, животъ и можетъ распространиться по всему тѣлу. Появляются красныя зудящія точки, смѣняющіяся потомъ узелками, величиною отъ просяного до чечевичнаго зерна; узелки или превращаются въ пузырьки, которые лопаются и болѣзнь принимаетъ «мокнущій» характеръ, или же узелки засыхаютъ и кожа шелушится—«сухая» Ч.; пузырьки и пустулы скоро засыхаютъ въ сѣрожелтые корки; волоса выпадаютъ, кожа утолщается, дѣлается складчатой, сильно зудитъ; животное, пораженное Ч., истощается и въ концѣ-концовъ погибаетъ. При лѣченіи употребляются линименты креолиновой, дегтярной, а также креозотъ, карболовая кислота. У *рогатаго скота* встрѣчается наожниковая и кожеѣдная Ч. и въ общемъ признаки проявленія послѣдней одинаковы какъ и у другихъ животныхъ: узелки, выпотѣніе жидкости, усиленное шелушеніе эпидермиса, выпаденіе волосъ, сильный зудъ, образованіе корки, утолщеніе и сморщиваніе кожи. Кожеѣдная Ч. у рогатаго скота называется еще и «хвостовой», вслѣдствіе того, что излюбленными мѣстами бываютъ ямки по бокамъ задняго прохода, а также вокругъ корня хвоста. Лѣченіе—какъ и у лошади: карболовое мыло, креолиновая мазь, дегтярная мазь. У *козъ и свиней* наблюдается зудневая Ч. Ветеринарно-полицейскія мѣры противъ Ч. въ Россіи касаются главнымъ образомъ Ч. овецъ и выражаются въ предупрежденіи зараженія путемъ купанія овецъ въ соответствующихъ дезинфекціонныхъ жидкостяхъ и въ изоляціи неблагополучныхъ животныхъ, стадъ и отаръ, въ единичныхъ случаяхъ крайне истощенныя болѣзнью животныя подвергаются убиванію. Ср. Franz Friedberger и Fröhner, «Руководство къ частной патологіи и терапіи домашнихъ животныхъ»; Пютцъ, «Инвазіонныя и инфекціонныя болѣзни»; журн. «Арх. Ветер. Наукъ» (1893).

**Чесоточные клещи**, вызывающіе чесотку у человѣка и различныхъ животныхъ—составляютъ особую группу сем. Sarcoptidae, характеризующуюся, какъ и другія группы этого семейства, плоскимъ тѣломъ и колоколо-видными стебельчатыми присосками на ногахъ, но задняя пара или двѣ заднія пары ногъ отличаются отъ переднихъ: онѣ слабѣе развиты у самокъ, а иногда и у самцовъ и на нихъ находимъ вмѣсто присосокъ одну или двѣ щетинки. Слюна ядовита и вызываетъ болѣзненное состояніе кожи. Сюда относятся pp. Sarcoptes, Psoroptes и Chorioptes. У человѣка чесотка вызывается клещами Sarcop-  
tes scabiei, которые въ тоже время были



находимы еще на 10 видах млекопитающих, но при этом отличаясь или большей величиной, или большей ядовитостью, или нѣкоторыми деталями строения, такъ что можно думать, что мы имѣемъ дѣло съ разнообразностями. На человѣкѣ встрѣчаются разновидности: *S. scabiei* var. *hominis*, *equi*, *ovis*, *suus*, *cameli*, *aucheniae caprae*, *canis*, *vulpis*, *leonis* и *S. notoedres* (s. *minor*) var. *cati*. Клеши pp. *Chorioptes* и *Psoroptes* на человѣкѣ не живутъ и даже при искусственномъ перенесеніи не заражаютъ человѣка. На лошадяхъ живутъ *S. scabiei* var. *equi*, *Psoroptes longirostris* var. *equi* и *Chorioptes spathiferus*. На коровахъ *P. longirostris* var. *bovis* и *Ch. spathiferus*. На овцахъ — *P. longirostris* v. *ovis*, а равно сходное заболѣваніе причиняется у овецъ *Dermatodectes ovis*. У собакъ встрѣчается *Ch. escaudatus*, также и на кошкахъ, а равно сходное заболѣваніе вызываетъ и *Demodex folliculorum*, var. *caninus*. Кромѣ того на собакахъ встрѣчаются *S. scabiei* и *S. notoedres*. Послѣдній встрѣчается также у кошки, крысы, кролика, у которыхъ бываетъ также и *P. longirostris* var. *equi*. На домашнихъ птицахъ встрѣчается *S. mutans*. Кромѣ того Ч. клеши наблюдались у свиней, козъ, верблюда, газели, ламы, муфлона, льва, гіены, волка, лисы, медвѣдя, обезьяны, вобибата и др. Встрѣчающийся у человѣка *S. scabiei* — имѣетъ почти круглое тѣло, желтовато-бѣлаго цвѣта, покрытое многочисленными складками, а на спинѣ несетъ поперечные ряды щетинокъ. Переднія двѣ пары ногъ съ присосками, а заднія двѣ пары у самокъ съ щетинками, у самцовъ третья пара со щетинкой, а четвертая съ присоской. Задній проходъ у задняго края спинной поверхности. Живутъ въ сдѣланныхъ ими ходахъ въ эпидермисѣ. Ходы слегка извилисты и въ ихъ сѣбныхъ концахъ находятся комки кала и яича. Самцы умираютъ послѣ совокупленія, самки послѣ яйцекладки. Черезъ 4—8 дней вылупляются шестиногія личинки, которыя въ теченіе 14 дней линяютъ три раза, продѣлывая свои ходы. Ср. Mégnin, «Les parasites et les maladies parasitaires» (П., 1880); Броунъ, «Животные паразиты человѣка» (М., 1900).

В. М. Ш.

**Честерфильда острова**—группа маленькихъ скалистыхъ острововъ въ Тихомъ океанѣ, подъ 20° ю. ш. и 158°30' в. д. отъ Гринича, къ 3 отъ сѣв. оконечности Новой Каледоніи. Залежи гуано. Съ 1879 г. принадлежатъ Франціи.

**Честерфильдъ** (Chesterfield) — городъ въ англ. графствѣ Дерби. Жителей 25 тыс. Чугуннолитейные и латунные заводы. Кожевенное, хлопчатобумажное и позументное производство. Въ окрестностяхъ желѣзные и свинцовые рудники и каменноугольные копи. Городъ соединенъ съ р. Трентъ Честерфильдскимъ каналомъ (74 км. и 65 шлюзовъ).

**Честерфильдъ** (графъ Джемсъ) — см. Стенгопъ.

**Честерфильдъ** (Филиппъ - Дормеръ - Стенгопъ, графъ Chesterfield) — извѣстный англійскій дѣятель и писатель (1694 — 1773). Учился въ Оксфордѣ. Въ палату общинъ онъ

былъ избранъ еще до достиженія законнаго возраста, а въ 1726 г. по смерти отца занялъ его мѣсто въ палатѣ лордовъ, гдѣ обратилъ на себя всеобщее вниманіе своимъ краснорѣчіемъ. Былъ посланникомъ въ Гагѣ, затѣмъ намѣстникомъ Ирландіи; въ 1746 г. сдѣлался государственнымъ секретаремъ, но скоро удалился въ частную жизнь. Всю жизнь добивался Ч. одного — имѣть успѣхъ всюду, блистать во всѣхъ сферахъ жизни; именно потому, однако, настоящаго успѣха въ той области, которую Ч. считалъ своимъ призваніемъ — въ политикѣ — онъ не имѣлъ, хотя у него были всѣ данныя для этого. И въ исторію онъ попалъ со славою даровитаго, но легкомысленно растратившаго свои дарованія человѣка. Эта особенность его характера ярко запечатлѣлась и на единственномъ его литературномъ произведеніи. Въ литераторы онъ попалъ, можно сказать, нечаянно. У Ч. былъ сынъ, скромный юноша, искренно преданный наукѣ. Ч. непремѣнно хотѣлъ сдѣлать изъ него блестящаго дипломата, и въ этомъ духѣ велъ его воспитаніе съ самаго дѣтства. Такъ какъ сынъ былъ незаконный, то держать его при себѣ было неудобно, и Ч. велъ его воспитаніе при помощи переписки. Съ самаго ранняго возраста и до смерти сына Ч. не прекращалъ переписки, не думая, что сочиняетъ свои наставленія не только въ назиданіе сыну, но и въ назиданіе потомству. Послѣ смерти Ч. его письма были опубликованы его вѣсткой, получившей за нихъ огромный по тому времени гонораръ (болѣе 15000 руб. на наши деньги). Эту книгу принято считать непристойной; ея цѣль — научить сына трудному искусству блистать въ свѣтѣ и пользоваться успѣхомъ. До сихъ поръ книга сохраняетъ огромный интересъ не только какъ историко-бытовой матеріалъ, но и какъ литературное произведеніе. Салонный острякъ и тонкій цѣнитель жизни оставилъ въ ней памятникъ тому умѣнью пользоваться жизнью, какимъ обладалъ одинъ только XVIII-й вѣкъ. До сихъ поръ о книгѣ Ч. идутъ горячіе споры и самые опытные критики не могутъ сразу установить по отношенію къ ней надлежащаго масштаба.

А. Джг.

**Честеръ** — см. Сыры и сыровареніе.

**Честеръ** (Chester) — городъ въ сѣв.-амер. штатѣ Пенсильваніи, на р. Делавэръ, въ 10 миляхъ отъ Филадельфіи. Жителей 34 тыс. (1900). Сталеитенные и прокатные заводы, хлопчатобумажное производство, судостроеніе.

**Честеръ** (Chester) — гл. городъ англ. графства Чеширъ, въ 25 км. къ ЮЮВ отъ Ливерпуля; узловая станція многихъ желѣзныхъ дорогъ, недалеко отъ устья р. Ди. Жителей 37105. Средневѣковая толстая стѣна изъ краснаго песчаника возведена въ XIV в. на мѣстѣ римскаго вала. Главныя улицы выстѣны въ скалистой почвѣ; вслѣдствіе этого всѣ зданія въ Ч. построены на колоннахъ такимъ образомъ, что нижніе этажи образуютъ открытыя для прохожихъ галлерей (такъ наз. Chester Rows). Готическій соборъ. Старый замокъ временъ Вильгельма Завоевателя перестроенъ въ зданіе судебныхъ мѣстъ и тюремъ. Судостроеніе, мыловаренное и хи-



мическія производства. Вслѣдствіе обмеленія р. Ди до моря проведенъ новый каналъ, по которому на судахъ въ 300 тоннъ вмѣстимости перевозятся произведенія графства (главнымъ образомъ сыры) и товары Манчестера и Бирмингама. Въ окрестностяхъ Ч. бывшая усадьба Гладстона, Гаварденъ. Въ древности на мѣстѣ Ч. лежалъ городъ корнэвѣвъ *Дева*. Въ римское время здѣсь находился лагерь XX легіона. Въ средніе вѣка городъ, подъ именемъ Саег-Legion или Саег-Leon, былъ столицей валлійскаго королевства Гвинеди; въ 835 г. завоеванъ вессекскимъ королемъ Эбертомъ и названъ Lagceaster; въ теченіе цѣлаго вѣка былъ главной крѣпостью на границѣ съ Валлисомъ.

**Чести** (Маркъ-Антоніо Cesti) — францисканскій монахъ (1620—1669), одинъ изъ лучшихъ оперныхъ композиторовъ XVII стол. Первая его опера, «Oronte», была поставлена въ 1649 г. въ Венеціи. Въ своихъ операхъ, отличающихся оригинальностью, Ч. старался дать своеобразный характеръ речитативу. Онъ много содѣйствовалъ развитію оперы въ Италіи. Писалъ также кантаты и мадригалы.

Н. С.

**Чести нарушение** — такъ назывались по воинскимъ артикуламъ Петра Вел. позорныя наказанія. Различалось: тяжелое Ч. нарушение — «котораго имя на вислицѣ прибито, или шпата его отъ палача переломлена и воромъ (шельмъ) объявленъ будетъ» (см. Шельмованіе) и легкое — «егда который начальный человекъ чину изверженъ или безъ заслуженнаго жалованья и безъ пасу (или отпуснаго письма) отъ полку отосланъ, или изъ государства нашего выгнанъ будетъ».

**Честь.** Преступленія противъ Ч. — см. Обида личная (XXI, 505) и Оскорбленіе (XXII, 279).

**Честь воинская** — понятіе, трудно поддающееся формулировкѣ. Необходимость ея, какъ условія военнаго быта, всѣми сознается, но ея существо остается почти неуловимымъ. Вникая въ это понятіе, нельзя не замѣтить, что воинская Ч. представляетъ собою явленіе крайне сложное, чѣмъ, конечно, и объясняется его неуловимость. Она несомнѣнно присуща войску и составляетъ его характерную черту во всѣ эпохи человѣческаго существованія. Понятію воинской Ч. въ разныя эпохи сообщалось различное содержаніе, но оно неизмѣнно заключаетъ въ себѣ нѣчто отличное отъ понятія Ч. вообще. Понятіе Ч. не есть понятіе правовое. Оно коренится исключительно въ нравственномъ самосознаніи и, не имѣя формальнаго основанія, представляетъ столь же относительнымъ, какъ и принципы нравственности. Но оно не есть и нравственный принципъ, по крайней мѣрѣ, въ существенной своей части оно не совпадаетъ съ этикой. Понятіе Ч. распадается на понятіе личной Ч. и коллективной. Если съ точки зрѣнія личной Ч. «честное» тождественно съ «нравственнымъ» — и то, впрочемъ, не всегда, — то съ точки зрѣнія чести коллективной или корпоративной соотношеніе получается иное: «честное» можетъ быть въ нравственномъ смыслѣ безразличнымъ,

можетъ даже оказаться и прямо безнравственнымъ. Между тѣмъ, каждая социальная группа всегда имѣетъ свою особую корпоративную Ч., которая служитъ связующимъ началомъ для ея членовъ и потому является однимъ изъ условій самаго существованія данной группы, выражая степень сплоченности ея членовъ въ одно цѣлое. Воинская Ч. есть честь корпоративная и уже въ силу того отлична отъ Ч. вообще. Но она отлична, по содержанію, и отъ Ч. другихъ социальныхъ единицъ, поскольку войско представляетъ собою единицу своеобразную. Понятіе воинской Ч. развилось на почвѣ чувства самолюбія. Функция войны составляетъ тяжелую обязанность для человека. Она требуетъ отъ него риска собственной жизнью, принесенія высшего, наиболѣе реальнаго блага — жизни — въ жертву отвлеченному представленію объ общемъ благѣ. Для выполненія функций войны необходимъ, слѣдовательно, такой стимулъ, который былъ бы въ состояніи подовать въ человѣкѣ чувство личнаго самосохраненія. Этотъ стимулъ можетъ имѣть исключительно нравственный характеръ — потому что никакое реальное благо не въ силахъ конкурировать съ благомъ жизни, — и долженъ корениться въ природѣ человѣка — потому что, взятый извнѣ, онъ не будетъ обладать достаточной интенсивностью. Такимъ стимуломъ является чувство личнаго самолюбія. Удовлетвореніемъ его, правда, грубымъ, но производящимъ всегда наибольшій эффектъ, служатъ внѣшнія почести. Съ древнѣйшихъ временъ общественное сознаніе начинаетъ вырабатывать рядъ мѣръ, направленныхъ къ тому, чтобы, путемъ возбужденія въ человѣкѣ, посвящающемъ себя войнѣ, чувства честолюбія, развитъ въ немъ чувство самолюбія: функция войны пріобрѣтаетъ почетный, даже религіозный характеръ; подвиги храбрости, которая и есть не что иное, какъ надлежащее развитое чувство самолюбія, превозносятся; побѣдители окружаются ореоломъ славы. Но всѣ эти мѣры, преслѣдующія спеціальную цѣль, односторонни и развиваютъ чувство личнаго самолюбія лишь въ одномъ направлении — какъ стимулъ, необходимый для войны. Поэтому и понятіе военной Ч. получаетъ такой же односторонній характеръ. Сущность войны есть бой, и все, что составляетъ «бой» съ врагомъ, есть «честное» для воина: въ этомъ его Ч.; наоборотъ, что выражаетъ уклоненіе отъ боя, хотя бы изъ чувства состраданія или человеколюбія — «нечестное». На ряду съ чувствомъ личнаго самолюбія, въ основѣ понятія воинской Ч. лежитъ чувство коллективнаго самолюбія, развивающагося всегда при совмѣстной дѣятельности и составляющаго существенный факторъ коллективной жизни. Но такъ какъ войско представляетъ собою колоссальную, по размѣрамъ, единицу, то на основѣ коллективнаго самолюбія развивается понятіе корпоративной чести не всего войска, какъ единого цѣлага, а Ч. отдѣльныхъ войсковыхъ административныхъ или тактическихъ единицъ — Ч. полка, батареи, роты. Имѣя столь глубокое обоснованіе, воинская Ч. со-